

26.03.2014

IR/ML

POTILASOHJE YSKÖSKERÄYKSESTÄ

Persia

دستور جمع آوری اخلاط سینه بیماران

هدف از پژوهش:

- بر رسی و دریافتن اینکه آیا امکان دارد که باکتریهائی که در مرض سل و یا مایکو باکتریهای محیط زیست (mykobakteria) وجود دارند در خلطی که از سرفه زدن جدا می شود رشد کنند.

چون باکتری مرض سل ممکن است به مقدارهای مختلفی در اخلاط سرفه وجود داشته باشد، بنابر این نمونه اخلاط را باید در سه روز متوالی و در درجه اول در سه صبح متوالی جمع کرد.

- نمونه اخلاطی که از شش ها بالا می آید را از طریق سرفه زدن (منظور بزاق و یا آب دهان نیست) در قوطی (ظروف نمونه) پلاستیکی مخصوص نمونه برداری که دارای در پیچدار می باشد جمع کنید.

- در قوطی نمونه برداری را که پیچدار هست محکم ببندید.

- اطمینان حاصل کنید که برچسب اطلاعات شخصی به هر کدام از قوطی ها چسبانده شده.

- قوطی های نمونه را در یک کیسه پلاستیکی شفاف گذاشته و سر کیسه را ببندید و در یخچال نگهداری کنید.

- همان روزیکه همه نمونه ها را جمع کردید قوطی های نمونه را به آزمایشگاه تحویل دهید.

دستور تحویل قوطی ها و یا ظروف نمونه: