

دغه معلومات خان سره وساته.

دغه معلومات خپل ډاکټر يا نرسی ته وښايه.

د نري رنځ يا توبرکلوز په هکله معلومات او ددی ناروغی معاینات او چک کول

ولی ستاسی ته دغه معلومات درکړل شول؟

په فنلند کی د نري رنځ يا توبرکلوز يوه نادره ناروغي ده. دلته دښه مراقبت په اساس کابو له منځه تللی ده. ستاسی له داسی هیواد څخه دلته راغلي یاست، چی هلته د نري رنځ په ناروغی ډیر خلک اخته دی. کیدای شی په خپل نږدی چاپیریال کی دغه ناروغي خپاره او خلک په دی ناروغی اخته کړی بی له دینه چی ستاسی پوهه شی. ستاسی دخپلی روغتیا لپاره، دخپلوانو او دنوروخلکو روغتیا لپاره دا ضروری ده، چی د نري رنځ يا توبرکلوز ناروغي تشخیص شی او په وخت سره بی درملنه وشي.

په فنلندکی ددی غوښتنه کیږی، چی دخارجیانو روغتیا اوصحت ته پاملرنه وشي. داځکه، چی ستاسی دلته ددرومیاشتونه زیاته موده تیروئ نو ستاسی حق لری، چی په وریا توگه دسینی عکس یادسینی اکسری واخلي. عکس اخستل اختیاری دی. په عکس کی لیدل کیږی، چی ستاسی په سږو یا تنفسی جهاز کی خوبه کوم دتوبرکلوز يا نري رنځ ناروغی تغیرات موجود نه وی.

دسینی عکس اخستل

دسږو توبرکلوز ناروغي اکثره دسینی د عکس په اخیستو سره تشخیص کیږی. عکس اخستل امنیتي دی کوم خطر نلری. هغه ښځی چی اولاد یعنی حمل لری باید د عکس اخستو څخه دمخه خبر ورکړی. هغه حمل لرونکی ښځی چی علایم ونلری ددی دسینی عکس باید دحمل په وروستیو میاشتو کی واخستل شی.

دسینی عکس یا رادیوگرافی ستاسی داوسیدوښار په صحی مرکزکی اخستل کیږی. دسینی عکس اخستل ستاسی لپاره په وریاد توگه ترسره کیږی. که چیری ستاسی دسینی په عکس کی کوم تغیرات ولیدل شی نو ستاسی سره بیا اړیکه نیول کیږی دنورو ضروری معایناتو ترسره کولو لپاره او وخت درته اخستل کیږی.

د نري رنځ يا توبرکلوز ناروغي علایم څه ډول دی؟

دسږو توبرکلوز ناروغي مهم علایم دوامداره ددرو اوونبونه زیات توخی ده، چی وروسته دوخت په تیریدو سره په بلغم اوری. دتوخی په وخت کی زیررنگ ته نږدی، یا سوررنگه او یا دوینی په رنگ بلغم لیدل کیږی او د توبرکلوز دناروغی دزیات انکشاف په صورت کی نفس تنگی او دسینی درد رامنځته کیږی.

دتوبرکلوز په ناروغي اخته کس کیدای شی تبه ولری، وزن بی کم شی او دشبې لخوانه زیاتی خولی کوی. دهغه اشتها ضعیفه کیږی او روغتیا بی بد تر کیږی. او علایم بی نور هم کیدای شی ولی دا په دی پوری اړه لری، چی د بدن کوم غړي دتوبرکلوز په ناروغی اخته دی.

په ماشومانوکی دتوبرکلوز ناروغی له امله دماشومانو وده او نمو وروکیږی.

څه باید وکړئ که چیری اوس مهال او یا وروسته دتوبرکلوز په قسم علایم ولری.

دخدننه پرته دخپل ښار له صحی مرکز سره اړیکی ونیسی. اودډاکټر معاینات، لیدل اوچک کول ضروری دی. دډاکټر لیدل، معاینات او چک کول ستاسی لپاره په وریا توگه ترسرخ کیږی. ستاسی د معایناتو معلومات د خارجیانو بخش مسولینوته نه ورکول کیږی.

نري رنځ يا توبرکلوز څه شی ده؟

نري رنځ يا توبرکلوز دهیچا یا نیمگرتیا اوقصورنه شی گنل کیدای. توبرکلوز يوه ساري ناروغي ده. دا ناروغی دیو میکروب پواسطه، چی مایکو باکټیریم توبرکلوزس نومیږی رامنځته کیږی. په عمومی ډول په سږو کی لیدل کیږی، هلته التهابی شکل رامنځته کوی. وروسته باکټریی یا میکروبونه دوینی یا لنفاوی غدو پواسطه د بدن نورو غړوته سرایت کوی او د بدن نور غړی مصابوی لکه لنفاوی غدی، کلمی، پوستکی او مرکزی عصبی سیستم. دتوبرکلوز ناروغي کولای شی، چی په یوه وخت کی دناروغ په سږو هم او نوروغړوکی قرار ولری.

د نري رنځ او توبرکلوز ناروغي څه ډول سرایت کوی؟

دتوبرکلوز ناروغي د هوا پواسطه دیوه انسان نه بل انسان ته انتقالیږی. توبرکلوز باکټریه یا میکروب هوا ته انتشار کوی، کله چی دسږو توبرکلوز ناروغ خبری کوی، سندری وایی، توخیری یا پرنجیری. پدغه وخت کی دده سره په یوه کوټه کی ناست خلک دتنفس له لاری دتوبرکلوز باکټریه تنفس کولوسره اخی اوسپروته بی داخلیری. په دی ډول هغه څوک چی دتوبرکلوز له ناروغ سره بی د اوردی مودی

لپاره استگونه کړی وی کیدای شی په دی ناروغی اخته شی. او په دی ناروغی داخه کیدو زیات خطر دناروغ خپلی کورنی غروته دی چی ده سره یی نږدی استوگنه کړی وی.

دتوبرکلوز په ناروغی کوم خلک اخته کیدای شی؟

دتوبرکلوز په میکروب الوده کسانو څخه یواخی بوکس یی په لسوکی دتوبرکلوز په ناروغی اخته کیری. دتولونه اسانه، چی په دی ناروغی اخته کیری دپنځوکالونو څخه کم عمره ماشومان دی ، ځوانان، مشران او هغه خلک چی دبدن مقاومت یی ضعیفه وی په دغ ناروغی یی داخه امکان زیات دی.

څومره زر دنري رنځ د میکرو الودگی په ناروغی باندی بدلیری؟

ماشومان، چی عمرونه یی دپنځو کالونو څخه کم وی وکسین هم ورته نه وی ورکړل شوی کیدای شی په یوڅواونیوکی یا دیوی میاشتی په موده کی دالودگی نه په ناروغی اخته شی. لویان چی کومه بله اساسی ناروغی ونلری دیوه یا ددوکالونو په جریان کی دتوبرکلوز دالودگی نه دتوبرکلوز په ناروغی اخته کیدای شی. دتوبرکلوز دمیکروب د ککړویدو یالودگی نه کیدای شی یو څوک دلسوکالونو ورسته په دغه ناروغی اخته شی. دنري رنځ یاتوبرکلوز علایم په یاد ولری.

چیرته او څرنګه توبرکلوز چک اومعاینه کیری؟

دتوبرکلوز معاینات په خپلو صحی مرکزونو، دشاگردانو اویا دکار په صحی مرکزونوکی ترسره کیری. دوامداره معاینات په روغتون کی ترسره کیری. دماشومانو معاینات دماشومانو وات یا په پولی کلینیک کی ترسره کیری. غاښانو، لویانو دسپرو توبرکلوز دسپرو ناروغیو بخش کی یا پولی کلینیک کی ترسره کیری. کله چی شک دسپرو په توبرکلوز وی نو دسپنی عکس اودبلغم معاینات رنگ اوکرلو پواسطه ترسره کیری. ټوخی نه هم کولایشو دتوبرکلوز جین بنکاره کولولپاره عاجل ټیسټ ترسره کړو.

بعضی وخت کی ددی ضرورت پیدا کیری سپرو پایپونو یا برنشونو ته پایپ تیر شی معاینات یی تر سره شی یا دسپرو سی ټی سکن ترسره شی. کله چی دسپرو توبرکلوز نه بغیر دبدن نورو غرو توبرکلوز معاینات ترسره کیری نو د مختلف قسمه تصویریری میتودونو څخه کار اخستل کیری. اضافه له دینه دژوندی ارګان څخه امساج اویا تازه لنده نمونه اخستل کیری.

دتوبرکلوز څه ډول درملنه کیری؟

توبرکلوز ددوا پواسطه تداوی کیری. دوا په شروع کی اقلا څلور قسمه وی. دعادی توبرکلوز تداوی کم از کم نیم کال نیسی. توبرکلوز هغه وخت بڼه تداوی کیری، چی په وخت سره یی تشخیص و شی اوپه وخت سره یی درملنه و شی. دتوبرکلوز درملنه په فنلند کی بڼه او په وریا توګه تر سره کیری.

اضافه معلومات په لاندی انټرنیټی پاڼه کی ولولی

www.tuberkuloosi.fi