

Tuberkuloositilanne Ukrainassa

Tuberkuloosi ja erityisesti sen lääkkeille vastustuskykyiset tautimuodot ovat yleisiä Ukrainassa. Vuonna 2020 tuberkuloosin ilmaantuvuus oli 73/100 000 ja uusia tapauksia todettiin noin 20 000. Tärkeimmille lääkkeille vastustuskykyisiä MDR-TB ja XDR-TB -tapauksia oli noin 20% uusista tapauksista. Myös HIV:n ja TB:n yhteisinfektio on Ukrainassa yleinen.

Sotatilan vuoksi jo yli 1,5 miljoona ukrainalaista on paennut kotimaastaan (YK:n julkaisema tieto 6.3.2022). Tuberkuloosin hoito voi keskeytyä pakomatkan aikana ja tartuntariski kasvaa ahtaissa väliaikaisissa majoituksissa. Myös piilevän tuberkuloosi-infektion aktivoitumisen riski kasvaa.

Tuberkuloosin mahdollisuus tulisi muistaa kaikkien Ukrainasta tulevien kohdalla, joilla on tautiin sopivia oireita (pitkittynyt yskä, yskökset, veriyskä, ruokahaluttomuus, laihtuminen, kuumeilu, voimakas väsymys tai yöhikoilu). Tuberkuloosin seulontaa (tuberkuloositiedon jakaminen ja keuhkokuvaus) olisi tärkeä tarjota myös oireettomille Ukrainasta saapuville.