

Ukrainan sota ja tuberkuloosi

Tuberkuloosi ja erityisesti sen lääkkeille vastustuskykyiset tautimuodot ovat yleisiä Ukrainassa. Vuonna 2020 tuberkuloosin ilmaantuvuus oli 73/100 000 ja uusia tapauksia todettiin noin 20 000. Tärkeimmille lääkkeille vastustuskykyisiä MDR-TB ja XDR-TB -tapauksia oli noin 20% uusista tapauksista. Myös hivin ja TB:n yhteisinfektio on Ukrainassa yleinen.

Helmikuussa 2022 alkaneen sodan vuoksi jo yli 7 miljoonaa ukrainalaista on paennut kotimaastaan. Suomessa tilapäisen suojelun hakemuksia on lokakuun 2022 alkuun mennessä jättänyt yli 40 000 henkilöä. Ajantasaiset tiedot löytyvät:

- YK:n pakolaisjärjestön [UNHCR:n sivuilta](#)
- [Maahanmuuttoviraston sivuilta](#).

Tuberkuloosin hoito voi keskeytyä pakomatkan aikana ja tartuntariski kasvaa ahtaissa väliaikaisissa majoituksissa. Myös piilevän tuberkuloosi-infektion aktivoitumisen riski kasvaa. Tuberkuloosin mahdollisuus tulisi muistaa kaikkien Ukrainasta tulevien kohdalla, joilla on tautiin sopivia oireita (pitkittänyt yskä, yskökset, veriyskä, ruokahaluttomuus, laihtuminen, kuumeilu, voimakas väsymys tai yöhikoilu).

THL suosittaa, että kaikille Ukrainasta saapuville tarjotaan tuberkuloosin seulontaa. Tämä sisältää oirekyselyn ja keuhkokuivauksen lisäksi tuberkuloositiedon antamisen. Seulottavalle tai hänen vanhemmilleen kerrotaan tuberkuloosista ja sen oireista. Erityisesti mainitaan tuberkuloosin oireiden kehittymisen mahdollisuus Suomessa oleskelun aikana. Seulontaan osallistuvaa kehoitetaan hakeutumaan viipymättä lääkärin vastaanotolle, jos hänelle ilmaantuu mahdollisia tuberkuloosin oireita. Tuberkuloositiedon jakamisessa voi hyödyntää [ukrainankielistä tiedotetta](#).

- Lisäohjeita terveydenhuollon ammattilaisille [THL:n sivuilla](#).