



مجموعه نمونه های تف یا بلغم در توبرکلوز.

- بلغم از شش های شما صرفه شده است. معمولاً از شما خواسته می شود تا سه نمونه بلغم را تهیه کنید
- دو روز متوالی بلغم خود را جمع آوری کنید (صبح، روز و صبح روز بعد)
- حین جمع آوری بلغم برای معاینات از مردم دور بروید. در صورت امکان از خانه بیرون شوید و یا کلکین را باز کنید.

یک نفس عمیق بکشید. هوا را برای چند ثانیه نگه دارید. بسیار آهسته
هوا را دوباره بیرون سازید. دوباره یک نفس عمیق بگیرید. تا زمانی
صرفه شدید کنید که از دهن تان بلغم نیز بیرون گردد.



لعاب دهن یا بلغم تان را در بین بوتل شیشه ای که یک سرپوش پیچی دارد تف کنید



Yskösnäytteen kerääminen, dari

سرپوش بوتل شیشه ای را محکم ببندید



مطمئن شوید که برچسب هویت شخصی خود را در پایین هر یک از بوتل های شیشه ای چسبانده اید.



هر بوتل شیشه ای نموده را را در پلاستیک روشن بسته کنید.



نمونه ها را در بوتل شیشه ای در یخچال نگهداری کنید. زمانیکه هر سه
نمونه های را در بوتل های شیشه ای جمع آوری نمودید، در عین روز
به لابراتوار ببرید.