


10 FAKTAA

LATENTISTA TUBERKULOOSI-INFEKTIOSTA



1

Keuhkotuberkuloosi tarttuu hengitysilman välityksellä ihmisestä toiseen

2

Latentti eli piilevä tuberkuloosi-infektio on tila, jossa tartunnan jälkeen bakteerit jäävät lepotilaan elimistöön

3

Henkilöllä ei ole tuberkuloosisairautta, hän on oireeton eikä tartuta tuberkuloosia muihin ihmisiin

4

Bakteerit voivat kuitenkin aktivoitua ja lisääntyä, jolloin kehittyy tuberkuloosisairaus

5

Noin yksi kymmenestä tartunnan saaneesta sairastuu tuberkuloosiin

6

Sairastumisen riski on suurin ensimmäisen 2 vuoden aikana tartunnan jälkeen, mutta sairastua voi vielä vuosikymmenienkin kuluttua elimistön immuunipuolustuskyvyn heikentyessä

7

Latentti tuberkuloosi-infektio voidaan todeta verikoetestillä

8

Sairastumista voidaan ehkäistä 1–6 kk mittaisella lääkehoidolla

9

Lääkehoito annetaan henkilöille, joilla on selkeästi suurentunut sairastumisriski

10

Lääkehoito aloitetaan erikoissairaanhoidossa ja se on hoidettavalle maksuton